

【Problem List】

#1. 失神のエピソード→意識障害、片麻痺

突然の嘔吐を伴う失神で発症し、意識障害と左片麻痺が引き続いて起こった。MRI にて両側後頭葉および前頭葉、小脳、右側頭葉に融合性の多発新規梗塞巣を認めた。

#2. 多発性の動脈塞栓症

これらに対し、前医にてヘパリン、アスピリンが開始されている。

#2-1. 急性心筋梗塞

心電図異常：II, III, aVF, V3-V6 誘導の ST 上昇。心エコーで左室壁運動異常、収縮能は正常下限。冠動脈造影で左前下行枝遠位部の造影欠損、バルーン拡張による血流改善は不十分であった。失神から 8 時間時点で AST, CK, CK-MB, troponin T が上昇。

#2-2. 両側腎動脈塞栓

前医での造影 CT にて腎灌流低下。血管造影にて両側腎動脈閉塞。血清クレアチニン 1.5mg/dL。

#2-3. 上腸間膜動脈塞栓

前医での造影 CT にて小腸の造影低下。血管造影にて上腸間膜動脈の完全閉塞。カテーテル的に塞栓除去および tPA 投与が試みられたが、少量の検体が得られたのみで血流再開には至らず。

#3. 左心房内 mass

径 2.3cm x 1.5cm。心房中隔から連続するが可動性は高い。エコー上は葉状の構造を認める。

#4. 僧帽弁逆流症

胸骨左縁から心尖部に放散する 2/6 度の汎収縮期雑音を聴取し、心エコーにて確認された。

#5. 前立腺癌

4ヶ月前に診断、放射線化学療法中であるが PSA の上昇あり、手術が検討されていた。

#6. 凝固能異常

PT 15.9 sec (基準値：11.1-13.1) , aPTT >150 sec (22.1-35.1)。ヘパリン投与中である。

#7. 低カリウム血症 (3.4 mEq/L)

#8. 貧血 (Hct 35%)

エリスロポエチン服用中。

#9. 高血圧 (入院時血圧 182/78 mmHg)

アムロジピン、ベナゼプリル服用中。

#10. 糖尿病 (入院時血糖値 212 mg/dL)

チアゾリジン系、SU 薬、ビッグアナイド薬を服用中。

#11. 尿所見異常

#12. 陳旧性脳梗塞 (CT にて指摘)

#13. 胸部 X 線異常 (左心後部～左中肺野に透過性低下)