

## 第10回解答

8-1	(1) d. 心筋梗塞 (2) e. 狭心症 1, 2 順不同 (3) l. 心筋症 (4) f. 心筋炎 3, 4 順不同 (5) a. 各種不整脈 (6) h. 心房中隔欠損 (7) k. 心室中隔欠損 6, 7 順不同 (8) m. 動脈瘤 (9) b. 大動脈解離 8, 9 順不同 (10) c. 動脈硬化 (11) i. 血管閉塞 10, 11 順不同 (12) g. 静脈血栓 (13) j. 静脈瘤	8-6	(4) f. 心腔内のシャント (5) g. 壁の厚さ (6) h. 弁の性状 (7) a. 壁運動 (8) i. 弁狭窄 (9) c. 逆流の有無 4-9 順不同
8-5	(1) b. 右心系 (2) g. 左心系 1, 2 順不同 (3) h. 心拍出量 (4) e. 血液ガス (5) a. 右室 (6) f. 左室 5, 6 順不同 (7) c. 冠動脈造影 (8) i. 閉塞 (9) d. 狭窄 (10) j. 攣縮	8-8	(1) e. 先天性心疾患 (2) d. 心弁膜症 1, 2 順不同 (3) c. 収縮期雑音 (4) a. 拡張期雑音 (5) f. 連続性雑音 (6) b. 機能性雑音
8-6	(1) d. 形態 (2) b. 機能 1, 2 順不同 (3) e. 血液動態	8-13	(1) a. MVR (2) c. PTMC (3) d. OMC
		8-16	(1) b. リウマチ熱 (2) f. 僧帽弁逸脱症候群 (3) g. 弁破壊 (4) e. 穿孔 3, 4 順不同 (5) d. 心筋梗塞 (6) c. 左心不全 (7) b. 右心不全 6, 7 順不同
		8-18	(1) c. 心房中核欠損症 (2) b. 心室中核欠損症 (3) e. 動脈管開存症 1-3 順不同 (4) a. ファロー四徴症 (5) f. 肺動脈弁狭窄症 (6) d. 大動脈弁狭窄症 5, 6 順不同

8-26	(1) a. 狭窄病変 (2) e. 酸素 (3) c. 胸痛 (4) d. 胸部圧迫感 3, 4 順不同 (5) b. 狭心症 (6) f. 心筋梗塞	8-37	(1) ○ (2) ○ (3) × (4) ○ (5) ○
8-29	(1) b. 栄養指導 (2) g. 生活習慣の改善 (3) d. ニトログリセリン製剤 (4) f. 硝酸薬 (5) c. β遮断薬 (6) a. Ca拮抗薬 (7) b. PTCA・PCI (8) h. 大動脈冠動脈バイパス術 (CABG)	8-39	(1) f. 呼吸困難 (2) d. 起坐呼吸 (3) b. 咳漱 (4) e. 血痰 (5) a. 易疲労感 1-5 順不同 (6) j. 浮腫 (7) h. 体重増加 (8) i. 尿量減少 (9) c. 肝腫大 (10) g. 食欲不振 6-10 順不同
8-33	(1) f. 心内膜 (2) j. 弁膜 (3) h. 難治性 (4) d. 基礎心疾患 (5) g. 糖尿病 (6) c. 悪性腫瘍 (7) b. ステロイド治療 5-7 順不同 (8) e. 起因菌 (9) i. 敗血症 (10) a. DIC	8-42	(1) d. 被殻出血 (2) b. 視床出血 (3) a. 橋出血 (4) c. 小脳出血
8-36	(1) × (2) ○ (3) × (4) ○ (5) ○ (6) ○ (7) ○	8-43	(1) d. 破壊 (2) b. 脳塞栓 (3) a. アテローム血栓性 脳梗塞 (4) c. ラクナ梗塞 3, 4 順不同
		8-44	(1) b. 硬膜 (2) a. クモ膜 1, 2 順不同 (3) e. 頭部外傷 (4) c. 数か月 (5) d. 静脈

<p>8-45 (1) a. CT (2) f. 脳浮腫 (3) e. 促進 (4) c. 血圧低下 (5) j. 被殻出血 (6) h. 皮質下出血 (7) d. 小脳出血 5-7 順不同 (8) b. 血圧コントロール (9) g. 脳浮腫コントロール 8,9 順不同</p> <p>8-48 (1) j. 片麻痺 (2) h. 半身感覚障害 (3) i. 半盲 (4) d. 失語 1-4 順不同 (5) e. 失行 (6) f. 失認 (7) a. ホルネル症候群 (8) c. 眼瞼下垂 (9) g. 縮瞳 (10) b. 眼球陥凹 8-10 順不同</p> <p>8-49 (1) c. 脳卒中 (2) b. 脳血管造影 (3) a. ウィリス動脈輪</p>	
---	--