

第7回解答

<p>6-48 (1) 甲状腺ホルモン (2) 代謝 (3) クレチン症 (4) 慢性甲状腺炎</p> <p>6-50 (1) × (2) ○ (3) ○ (4) × (5) × (6) ○</p> <p>6-52 (1) 亢進 (2) 破壊 (3) 高値 (4) バセドウ (5) 亜急性</p> <p>6-54 (1) TSHHレセプター (2) 甲状腺腫大 (3) 過剰産生 (4) 女性</p> <p>6-56 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) × (5) ○</p> <p>6-57 (1) 自己免疫 (2) 低下 (3) 女 (4) γ-グロブリン (5) 抗マイクロゾーム (6) 抗サイログロブリン (7) 頸部エコー (8) 甲状腺ホルモン製剤</p> <p>6-60 (1) 作用不足 (2) 遺伝素因</p>	<p>6-60 (3) 肥満 (4) ストレス (5) 感染 (6) 妊娠 3-6 順不同 (7) 腓ランゲルハンス島 (8) 低下 (9) 欠如 (10) 抵抗性</p> <p>6-62 (1) インスリン依存型 (2) インスリン非依存型 (3) 少ない (4) 40~60%が糖尿病 (5) 0~25歳 (6) 40歳以降が多い。最近は若年層も増加。 (7) やせ型 (8) 肥満型 (9) 急激 (10) 慢性も急性発症もある。 (11) +++ (12) -~±</p> <p>6-64 (1) 126 (2) 200 (3) 75 (4) 1 (5) 5.8 (6) 6.5</p> <p>6-66 (1) 細小血管障害 (2) 視力低下 (3) 視野欠損 (4) 光凝固療法 (5) 硝子体切除術 4,5 順不同</p>
--	---

6-66 (6) 腎系球体	6-78 (7) 性早熟
(7) タンパク尿	(8) 17-KS
(8) 腎機能	6-79 (1) ○
(9) 尿毒症	(2) ×
(10) 透析療法	(3) ×
(11) 末梢神経障害	(4) ×
(12) 疼痛	(5) ×
(13) しびれ感	(6) ○
12,13 順不同	6-80 (1) ×
(14) 知覚鈍麻	(2) ×
(15) 起立性低血圧	(3) ○
(16) 下痢	(4) ×
(17) 便秘	(5) ×
(18) インポテンツ	(6) ×
15-18 順不同	6-82 (1) ×
(19) 足先	(2) ×
6-76 (1) ×	(3) ○
(2) ○	(4) ×
(3) ○	(5) ×
(4) ×	(6) ○
(5) ×	(7) ○
(6) ○	(8) ○
6-77 (1) ×	(9) ×
(2) ○	(10) ○
(3) ×	(11) ○
(4) ○	(12) ○
(5) ○	(13) ×
6-78 (1) 過剰分泌	8-86 (1) ○
(2) 性器	(2) ○
(3) 副腎皮質ホルモン	(3) ×
合成酸素欠損	(4) ×
(4) 副腎腫瘍	(5) ○
(5) 男性化	(6) ○
(6) 半陰陽	(7) ○

6-93 (1) e. 体液

(2) d. 細胞内

(3) c. 細胞外

(4) b. 高張性脱水

(5) f. 低張性脱水

(6) a. 口渴

(7) g. 尿量減少

6,7 順不同

6-97 (1) H^+

(2) OH^-

(3) 酸性

(4) 中性

(5) アルカリ性

(6) 炭酸

(7) 重炭酸

(8) 分圧

(9) 肺

(10) 腎

(11) 7.35

(12) 7.45

(13) アシドーシス

(14) アルカローシス