

第8回解答

7-1	(1) a. 中枢神経 (2) e. 末梢神経 (3) b. 脳 (4) f. 脳幹 (5) d. 脳神経 (6) c. 脊髄神経	7-8	(4) b. しても覚醒しない
7-2	(1) f. 末梢神経 (2) c. 体性神経 (3) a. 運動神経 (4) d. 知覚神経 (5) b. 交感神経 (6) e. 副交感神経	7-9	(1) b. 振戦 (2) c. 舞踏運動 1, 2 順不同 (3) a. 構音障害 (4) d. 失語症
7-3	(1) d. 体性神経 (2) a. 間脳 (3) c. 視床下部 (4) b. 交感神経 (5) e. 副交感神経	7-11	(1) f. 頭痛 (2) b. 悪寒 (3) g. 発熱 1-3 順不同 (4) d. 項部硬直 (5) a. ケルニツヒ徴候 (6) e. 髄膜刺激 (7) c. 抗生物質
7-4	(1) c. 硬膜 (2) a. クモ膜 (3) h. 軟膜 (4) g. 大脳鎌 (5) e. 小脳テント (6) d. 硬膜下腔 (7) b. クモ膜下腔 (8) f. 髄液	7-12	(1) i. 貯留 (2) g. 側頭葉 (3) d. 小脳 (4) f. 前頭葉 2-4 順不同 (5) m. 連鎖球菌 (6) a. 黄色ブドウ球菌 5, 6 順不同 (7) h. 中耳 (8) k. 副鼻腔 7, 8 順不同 (9) j. 臍 (10) e. 上気道 (11) l. 腹部 (12) c. 骨盤内臓器 9-12 順不同 (13) b. 開放性脳損傷
7-6	(1) a. 痙性麻痺 (2) e. 深部腱反射亢進 (3) c. 病的反射 1-3 順不同 (4) d. 不随意運動 (5) b. 随意運動	7-15	(1) b. 上位下位 (2) d. 早く (3) c. 神経難病
7-8	(1) a. 3-3-9 度 (2) d. しないでも覚醒している (3) c. すると覚醒する		

7-15	(4) a. 呼吸不全 (5) f. 肺炎 (6) e. 窒息 4-6 順不同	7-22	(8) h. 構音障害 7, 8 順不同 (9) j. 膀胱直腸障害 (10) f. 知能障害 9, 10 順不同
7-19	(1) g. 神経細胞脱落 (2) j. 老人斑 (3) c. アルツハイマー神経 原線維変化 1-3 順不同 (4) f. 若年性アルツハイマー病 (5) d. アルツハイマー病 (6) b. アルツハイマー型老年痴呆 (7) e. 健忘 (8) h. 精神活動 (9) i. 対症的薬物 (10) a. アセチルコリンエステ ラーゼ阻害剤	7-23	(1) e. 大脳皮質神経細胞 (2) i. 反復性 (3) g. 部分性 (4) d. 全般性 3, 4 順不同 (5) f. 特発性 (6) a. 症候性 5, 6 順不同 (7) h. 特発性部分 (8) c. 症候性部分 (9) j. 特発性全般 (10) b. 症候性全般 7-10 順不同
7-20	(1) b. 炎症性脱髄疾患 (2) e. 散在 (3) d. 再発 (4) c. 寛解 (5) g. 中枢神経 (6) f. 自己免疫説 (7) a. ウィルス感染説 6, 7 順不同	7-24	(1) f. 単純部分発作 (2) a. 複雑部分発作 (3) d. 両側半球障害 (4) b. 両側性 (5) e. 欠神発作 (6) c. 強直間代性発作
7-22	(1) d. 痙性麻痺 (2) i. 腱反射亢進 1, 2 順不同 (3) g. 複視 (4) c. 球後視神経炎 3, 4 順不同 (5) a. しびれ感 (6) e. 振動覚障害 5, 6 順不同 (7) b. 運動失調	7-25	(1) c. 延長 (2) k. 頻発 (3) j. 小発作 (4) l. 部分発作 3, 4 順不同 (5) h. 早急 (6) f. 治療 (7) e. 気道確保 (8) a. ジアゼパム (9) g. フェノパルピタール (10) i. 怠薬

7-25	(11) d. 大量飲酒 (12) b. 疲労 11, 12 順不同	7-36	3, 4 順不同 (5) f. 神経筋接合部 (6) c. 自己抗体
7-26	(1) c. 眼神経 (2) f. 上顎神経 (3) b. 下顎神経 1-3 順不同 (4) a. 1 枝 (5) k. 疼痛発作 (6) h. 脳幹 (7) j. 老化 (8) d. 硬く (9) g. 蛇行 (10) i. 拍動 (11) e. 神経	7-39	(1) c. 骨格筋 (2) g. 心筋 1, 2 順不同 (3) b. 伴性劣性 (4) e. 常染色体優性 (5) h. 常染色体劣性 3-5 順不同 (6) a. デュシェンヌ型 (7) d. 肢体型 (8) f. 顔面肩甲上腕型 6-8 順不同
7-28	(1) d. 末梢性顔面神経麻痺 (2) c. 妊婦 (3) a. 高血圧 (4) b. 糖尿病 2-4 順不同	7-42	(1) c. 損傷 (2) e. 姿勢 (3) a. 運動 2, 3 順不同 (4) d. 半永久的 (5) b. 非進行性
7-31	(1) c. 手根管 (2) a. 正中神経 (3) f. 末梢部 (4) e. 反復 (5) b. マッサージ (6) d. コンピュータープロ グラマー	7-43	(1) g. 脳の発達異常 (2) i. 母体の外傷・重症疾患 (3) f. 妊娠早期のウィル ス感染 1-3 順不同 (4) c. 出生時仮死 (5) e. 頭蓋内出血 (6) a. 核黄疸 4-6 順不同 (7) h. 脳炎 (8) d. 髄膜炎 (9) b. 重症脳症 7-9 順不同
7-34	(1) c. 胃腸炎感染 (2) a. 1~3 週間 (3) b. 運動 (4) d. 多発性末梢神経炎症		
7-36	(1) a. 易疲労性 (2) e. 脱力 (3) b. 寛解 (4) d. 増悪		