

シクロホスファミド（エンドキサン[®]）

このお薬は主に「**ネフローゼ症候群**の患者さん」「腎炎の患者さん」「膠原病の患者さん」の治療に使用します。

ネフローゼ症候群で使用される場合は

頻回再発型ネフローゼ症候群（1年間に再発が4回以上）

の患者さんの「再発の回数を減らすこと」を目的として使用します。

飲み薬で使用される場合は、1日1回お薬を内服します。

決められたお薬の量を8～12週間（2～3か月）内服します。下記に示す副作用がみられた際にはお薬を一旦中止したり量を減らしたりすることがあります。

主な副作用としては

骨髄抑制（白血球などの細胞の数が減る）、出血性膀胱炎（血尿が出たり排尿時に痛みを感じる）、易感染性（感染にかかりやすくなる）、嘔気・嘔吐、性腺障害（精子の数が減る、卵巣の働きが悪くなる）、脱毛、発がん性

などがあります。

副作用を防ぐため、一生のうちに使用できる量が決まっています。発がん性については、決められた投与量内であればその危険性はとても低いと考えられます。

お薬内服中に生ワクチン（「はしか」「風疹」「水ぼうそう」「おたふくかぜ」など）の予防接種を希望される際には、必ず主治医にご相談ください。