

D. 血液製剤使用情報(平成30年1月1日～12月31日)

6. アルブミン製剤(加熱ヒト血漿蛋白製剤も含む)の使用本数

(平成30年1月1日～12月31日)

| アルブミン製剤名 | メーカー | 規格 | | 使用本数 | グラム数 |
|-------------------------|----------|------------|--------|------|------|
| | | アルブミン濃度(%) | 用量(ml) | | |
| 例) アルブミン25% | CSLベーリング | 25% | 50 | 20 | 250 |
| 例) 献血アルブミン20%静注 | 日本血液製剤機構 | 20% | 50 | 20 | 200 |
| 例) 献血アルブミン5%静注 | 日本血液製剤機構 | 5% | 250 | 10 | 125 |
| 例) 献血アルブミン4.4% | 日本製薬 | 4.4% | 250 | 10 | 110 |
| 例) プラズマプロテインフラクション(PPF) | バクスター | 4.4% | 250 | 10 | 110 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | **** | **** | **** | | |

注意: 濃度と用量にご注意下さい。グロブリン製剤は記載しないでください。

メーカー名は可能な限りお願いします。

グラム数は使用本数に1本のアルブミン量を乗じて算出して下さい。