

# 新型コロナウイルスワクチン接種の 翌日に死亡した事例

〇〇病院 救命救急科 △△△△

# 患者プロフィール

# 30歳 男性

## 【身体情報】

身長：172cm

体重：84kg

## 【既往歴等】

**# 高血圧疑い**：会社の定期健診で5年前から指摘され、保健師による生活習慣指導。服薬なし。

**# 花粉症**：抗ヒスタミン薬服用中

# 臨床經過

2023.4.3

**8:00頃** 朝から頭が痛いといっていたが、体温は平熱で特に変わった様子はなかった。

**9:30頃** 近所の職域接種会場で新型コロナウイルス3回目を接種した。接種後の15分待機中に異変はなし。その後、会社で通常業務を行った（デスクワーク）。

**19:00頃** 自宅に帰宅し、いつも通りに夕食を済ませ、**20:30頃**に入浴するも、特に変わった様子はない。

**22:00頃** 就寝

2023.4.4

**8:30頃** いつもの時間になっても部屋から出てこないのので、家族が様子を見に行くと、意識のない状態を発見し、救急要請。

**8:50頃** 救急隊到着。橈骨動脈は触知できず、死戦期呼吸であったため、直ちに胸骨圧迫、mask換気を開始。AEDにてFV確認、除細動（1回）を行うも心拍再開せず。

**9:10** 当院、救命救急科に到着。ECGでasystole確認、胸骨圧迫を継続し、気管挿管、Vライン確保し、アドレナリン投与開始。

- 9:50** 家族に病状説明。  
これ以上の積極的治療は望まれなかったため、CPRを中止。
- 9:55** 死亡確認。
- 10:30** Ai-CTの同意を得て撮影。

# 【検査データ】

白血球	11,800 /μL	尿酸	3.13 mg/dL	総ビリルビン	0.52 mg/dL
赤血球	411 ×10 <sup>4</sup> /μL	尿素窒素	11.7 mg/dL	BNP	45.2 pg/mL
血小板	38.1 ×10 <sup>4</sup> /μL	血糖	163 mg/dL	CRP	10.29 mg/dL
血沈 (30分値)	42.0 mm	HbA1c	5.5 %	プロトン ビン時間	16.9 秒
アルブミン	3.3 g/dL	Na	140 mEq/L	INR	1.36
クレアチン キナーゼ	47 IU/L	K	3.6 mEq/L	D-ダイマー	3.72 μg/mL
クレアチン	0.58 mg/dL	Cl	100 mEq/L		


# Ai画像

死亡直後 10:30 Ai-CT

**DICOMビューアで画像提示**


# 外表所見 (解剖なし)

外表には明らかな異常所見なし。



# Ai画像 (読影所見)

**頭頸部、腹部には明らかな所見なし。**



**両側肺動脈の拡張と内腔には軽度の高吸収域があり血栓（塞栓）の可能性を疑う。**



# 最終診断 (死因診断)

院内では、死因を肺動脈血栓塞栓症とした。

➡ 直接死因は肺動脈血栓塞栓症でよいか？

遺族からは新型コロナワクチン接種との関係を聞かれたが、明確な回答はできず。

➡ ワクチンとの関係は？