

第 16 期 pES club step4 大会医学生シナリオ

平成 29 年 6 月 18 日

東京北医療センター 総合診療科

南郷 栄秀

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 薬剤部

五十嵐 俊

<http://spell.umin.jp>

あなたは 250 床の名羅手部総合病院に勤務する 2 年目初期研修医です。

大腿骨頸部骨折後のリハビリ目的で辰野武利さん（74 歳）男性が入院してきました。辰野さんはいわゆる多剤併用状態であり、入院コストに占める薬剤費も無視できないため減薬を検討した方がいいと薬剤師から提案されました。

辰野さんの減薬を計画し、辰野さんに説明してください。

《患者情報》

既往歴：胃潰瘍（手術歴あり）、狭心症（ステント留置）、心不全、腰部脊柱管狭窄症

サプリメント：マルチビタミン（詳細不明）

社会環境：無職（生活保護）、独居（今回の入院前までは生活は自立していた）、
県外（車で 3 時間程度の距離）に娘が在住

生活歴：機会飲酒、65 歳頃より禁煙（以降吸っていない）

処方内容：

ティアバランス点眼液 0.1% (5mL/本)	10 本	両目	1 日 4 回
アトルバスタチン錠 5mg 「KN」	1 錠	1 日 1 回	朝食後
イトプリド塩酸塩錠 50mg 「トワ」	3 錠	1 日 3 回	朝・昼・夕食前
クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg 「サワイ」	2 錠	1 日 1 回	寝る前
パントシン散 20% (1g/包)	1.5 包	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
タケキャブ錠 10mg	2 錠	1 日 1 回	朝食後
センノシド錠 12mg 「サワイ」	1 錠	1 日 1 回	寝る前
メコバラミン錠 500 μ g 「JG」	3 錠	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「NP」	3Cap	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「サワイ」	3 錠	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	3 錠	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
バイアスピリン 100mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後
スピロラクトン錠 25mg 「テバ」	1 錠	1 日 1 回	朝食後
フロセミド錠 10mg 「NP」	1 錠	1 日 1 回	朝食後
エフィエント錠 3.75mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後
マグミット錠 330mg	3 錠	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
ミカルデイス錠 20mg	2 錠	1 日 1 回	夕食後
トラムセット錠 (37.5mg/325mg)	6 錠	1 日 3 回	朝・昼・夕食後
クエチアピン錠 12.5mg 「アメル」	2 錠	1 日 1 回	寝る前
大建中湯 (1g/包)	3 包	1 日 3 回	朝・昼・夕食前