

# 第 21 期 pES club step4 大会薬学生シナリオ

2022 年 6 月 19 日

昭和大学藤が丘病院 薬剤部

鈴木 絢子

社会福祉法人聖母会 聖母病院 総合診療科

南郷 栄秀

<http://spell.umin.jp>

あなたは 150 床の大納目戸病院に勤務する 2 年目の薬剤師です。湯石道入さん (67 歳男性) は、腎機能の悪化に伴い半年前にシャントを造設し、本日、血液維持透析導入のため入院しました。

50 歳頃に高血圧を指摘され、7 年前に腎生検で巣状糸球体硬化症と診断されました。湯石さんは「昨日から息苦しくて動くとぜいぜいする」と話しています。入院時、身長 166 cm、体重 73 kg、血圧は 197/102 mmHg で、血液検査では、血清クレアチニン 8.83 mg/dL、BUN 107.2 mg/dL、尿酸 7.6 mg/dL、K 4.3 mEq/dL、Ca 7.8 mEq/dL、iP 6.9 mEq/dL、BNP 2632.3 pg/mL でした。胸部 X 線単純写真の心縦隔比は 67% で、胸水貯留がみられました。

自宅はアパートの 1 階で、ADL は自立しています。妻は既に他界して独居です。定年までは清掃の仕事をしていました。喫煙は 40 本×30 年間していましたが、現在は禁煙しているようです。

医師から「薬をいろいろ減らすから、説明をよろしくね」と言われました。

## 処方 (透析導入前)

炭酸水素ナトリウム	2g	1 日 2 回	朝夕食後
沈降炭酸カルシウム錠 500mg	3 錠	1 日 3 回	毎食直後
ポリスチレンスルホン酸 Ca 顆粒 5.6 g/包	2 包	1 日 2 回	朝夕食後
コディオ配合錠®EX 錠	1 錠	1 日 1 回	朝食後
フロセミド®錠 40mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後
メインテート®錠 2.5mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後
フェブリク®錠 10mg	2 錠	1 日 2 回	朝夕食後
クレストール®錠 2.5mg	1 錠	1 日 1 回	夕食後
ニフェジピン CR 錠 20mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後

## 処方 (透析導入後)

沈降炭酸カルシウム錠 500mg	3 錠	1 日 3 回	毎食直後
フロセミド錠 40mg	2 錠	1 日 1 回	朝食後

アドヒアランスを確認しながら、薬剤の変更点を湯石さんに説明してください (10 分間)。